

# Catálogo de Sementes Biológicas



## Brássicas

&

## Hortícolas de Folhas



AdviceAgriBusiness, Lda  
comercial@365agro.com  
Tel: 00351 913 894 820  
(Eng. Sérgio Margaço)  
www.adv-agri.com



Caros clientes,

É com enorme prazer que anunciamos que a Advice.AgriBusiness é representante em Portugal da empresa holandesa De BOLSTER, obtentora e multiplicadora de sementes de hortícolas, aromáticas, germinados, flores, espécies para cobertura e "adubos verdes", produzidas em Modo de Produção Biológico.

A De BOLSTER, empresa existente no mercado das sementes biológicas há vários anos, detém diversas variedades exclusivas, multiplica e comercializa sementes, em Modo de Produção Biológico, não OGM, com elevada germinação e a um preço justo.

Dado que a De Bolster comercializa mais de 300 variedades de dezenas de espécies, optámos por dividi-las em diferentes grupos: Brássicas e Hortícolas de Folhas, Frutos, Raízes, Aromáticas, Germinados, Flores e "Adubos Verdes", dando origem a diferentes catálogos.

Apresentamos-lhe o catálogo de Brássicas e Hortícolas de Folhas, que inclui diversas variedades de acelgas, alfaces, couves, folhas orientais, espinafres, entre outras.

Caso tenha alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar.

Esperamos corresponder às vossas expectativas.

A equipa Advice.AgriBusines.

## Índice

Acelga ( <i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i> )	4
Agrião de Água ( <i>Nasturtium officinale</i> )	4
Agrião de Jardim ( <i>Lepidium sativum</i> )	5
Agrião de Terra ( <i>Barbarea vulgaris</i> )	5
Aipo ( <i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i> )	5
Alface ( <i>Lactuca sativa</i> )	5
Alho Francês ( <i>Allium ampeloprasum</i> var. <i>porrum</i> )	8
Beldroega ( <i>Portulaca oleracea</i> )	8
Beldroega de Inverno ( <i>Claytonia perfoliata</i> )	8
Brócolo ( <i>Brassica oleracea</i> )	9
Canónigo ( <i>Valerianella locusta</i> )	9
Cardo ( <i>Cynara cardunculus</i> )	9
Chicória ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )	9
Couve Chinesa ( <i>Brassica pekinensis</i> )	9
Couve de Bruxelas ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Gemmifera</i> )	10
Couve-flor ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> )	10
Couve Kale ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> )	10
Couve Pakchoi ( <i>Brassica rapa</i> var. <i>chinensis</i> )	11
Couve Rábano ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i> )	11
Couve Repolho ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )	11
Couve Coração ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )	12
Couve Tatsoi ( <i>Brassica rapa</i> var. <i>rosularis</i> )	12
Endívia Frisada ( <i>Chicorium endívia</i> )	12
Erva Armola ( <i>Atriplex hortensis</i> )	13
Espinafre ( <i>Spinacia oleracea</i> )	13
Mix de Alfaces	14
Mix Asiático	14
Mizuna ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>campestris</i> )	14
Mostarda ( <i>Brassica juncea</i> )	14
Nabiça ( <i>Brassica rapa</i> )	15
Rúcula Cultivada ( <i>Eruca sativa</i> )	15
Rúcula Selvagem ( <i>Diplotaxis tenuifolia</i> )	15



Ref. 41885

### Acelga var. 5 Cores

*Beta vulgaris var. cicla*

A Acelga 5 cores é uma mistura de acelgas com pecíolos de múltiplas cores (vermelha, roxa, laranja, amarela e branca). As folhas destas acelgas são maioritariamente verdes. Mesmo depois de cozinhadas, os pecíolos mantêm a sua cor. Formam molhos bastante apelativos aos consumidores. Ciclo: 70 dias.



Ref. 41890

### Acelga var. Erbette ou Verde de Cortar

*Beta vulgaris var. cicla*

A acelga Erbette (PerpetualSpinach) é uma planta muito fácil de produzir, adaptando-se a muitos tipos de solos. Esta variedade apresenta pecíolos estreitos e folhas verdes, muito saborosas e utilizadas em diversos pratos. Ciclo: 70 dias.



Ref. 41910

### Acelga var. Rhubarb Chard

*Beta vulgaris var. cicla*

A acelga Rhubarb Chard é uma variedade muito atractiva, com folhas frisadas e avermelhadas e pecíolos vermelhos. É uma planta muito fácil de produzir, adaptando-se a muitos tipos de solos. Ciclo: 70 dias.



Ref. 41915

### Acelga var. Sunset Seleccionada

*Beta vulgaris var. cicla*

A acelga Sunset possui atractivos pecíolos de cor amarela alaranjada e folhas de cor verde brilhante.



Ref. 41900

### Acelga var. Verde de Penca Branca 3 ou Swisschard

*Beta vulgaris var. cicla*

A Acelga Verde de Penca Branca é uma variedade bastante fácil de produzir, adaptando-se a diferentes tipos de solos. É uma planta de porte grande com os caules de cor branca e as folhas verdes e lisas. Não espiga com facilidade. Se a densidade de sementeira for aumentada, produz folhas pequenas, que podem ser consumidas cruas em saladas. Ciclo: 70 dias.



Ref. 43290

### Agrião de Água

*Nasturtium officinale*

O agrião é uma planta herbácea, perene, de rápido crescimento, com utilização alimentar ou medicinal. O agrião de água é uma planta semiaquática, podendo crescer em água. As suas folhas crocantes e picantes são geralmente consumidas em saladas e sopas.



Ref. 41980

### Agrião de Jardim ou Agrião Mastruço var. Cressida

*Lepidium sativum*

Espécie que germina e cresce rapidamente, sendo apreciada pelo seu sabor levemente picante e aromático. Esta planta é utilizada em saladas, sopas, refogados e purés, usando-se principalmente as folhas dos rebentos jovens.



Ref. 43295

### Agrião de Terra

*Barbarea vulgaris*

O agrião de terra é uma planta bianual, também conhecida como *Barbarea*. As folhas são consumidas cruas ou cozinhadas. Este agrião é muito resistente ao clima de Inverno, mas espiga na primavera.



Ref. 41370

### Aipo var. Tall Utah

*Apium graveolens var. dulce*

O aipo Tall Utah é uma variedade em que os caules e as jovens folhas podem ser consumidos. Esta planta é rica em nutrientes. O aipo verde necessita de luz para germinar e não pode ser semeado muito profundo. A germinação é lenta e pode demorar até três semanas. O aipo exige um solo rico e não pode suportar ntensas geadas. Ciclo: 120-140 dias.



Ref. 41830

### Alface var. Black Seeded Simpson

*Lactuca sativa*

A alface Black Seeded Simpson, do tipo “de cortar ou *cut-and-come-again*”, é uma variedade de crescimento rápido que não forma cabeça. As folhas são de cor verde e frisadas. A variedade Black Seeded Simpson tem a forma de um cone e, após a colheita, novas folhas serão formadas no centro da planta. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 41840

### Alface var. Blonde de Paris

*Lactuca sativa*

A alface Batavia Blonde de Paris ou Loura de Paris forma folhas muito doces e crocantes, frisadas que formam um grande coração. Crescimento rápido. Ciclo semi-precoce. Tolera o espigamento. Pode ser produzida para “baby leaf”. Ciclo: 50-70 dias.





Ref. 41785

### Alface var. Cosima

*Lactuca sativa*

A alface Cosima possui folhas brilhantes e finas. A cabeça é bastante aberta e pesada.



Ref. 41832

### Alface var. Catalogna

*Lactuca sativa*

A alface Catalogna do tipo “de cortar ou *cut-and-come-again*” é uma variedade com folhas de excelente sabor, firmes e longas, de forma dentada. É precoce, com um espigamento lento. Não é muito sensível a doenças. Permite vários cortes, voltando a crescer. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 41831

### Alface var. Cocarde

*Lactuca sativa*

A alface Cocarde do tipo “de cortar ou cut ou *cut-and-come-again*” possui folhas longas, de forma dentada, muito atractivas com a sua tonalidade vermelha acastanhada. É precoce, muito saborosa e vigorosa. Resiste ao espigamento.



Ref. 41845

### Alface var. Iceberg 2

*Lactuca sativa*

A alface Iceberg 2 é uma variedade tradicional da Áustria. Forma folhas verdes muito brilhantes e crocantes com uma pequena margem vermelha. Possui resistência ao espigamento e ao míldio. Ciclo: 50-70 dias.



Ref. 41780

### Alface var. Little Leprechaun

*Lactuca sativa*

Esta alface, de tipologia Romana, possui um aspecto muito atractivo e é fácil de produzir. Forma um conjunto de folhas roxas altas, resistentes, de tamanho grande. A planta atinge tamanhos de 20-50 cm. Ciclo: 60-90 dias.



Ref. 41836

### Alface var. Lollo Bionda

*Lactuca sativa*

Esta variedade de alface não forma uma cabeça, mas uma roseta aberta com folhas fortemente frisadas, de textura firme e crocante, cor verde clara e com uma aparência atraente. Atinge cerca de 20 cm de altura. Esta alface, ao ser cortada, pode voltar a rebrotar. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 41837

**Alface var. Lollo Rossa***Lactuca sativa*

A alface Lollo Rossa, de crescimento rápido, forma folhas fortemente frisadas, com uma textura firme e crocante, de cor arroxeadada. Esta alface, ao ser cortada pode voltar a rebrotar, sendo utilizadas as suas folhas jovens. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 41839

**Alface var. Lollo Rossa Jenny***Lactuca sativa*

A alface “Lollo Rossa Jenny” é uma alface frisada com uma cabeça compacta. As folhas são fortemente frisadas e de cor roxa. Esta alface, ao ser cortada pode voltar a rebrotar, sendo utilizadas as suas folhas jovens. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 41835

**Alface var. Red Salad Bowl***Lactuca sativa*

A alface Red Salad Bowl, do tipo “de cortar ou *cut-and-come-again*”, possui um conjunto de folhas cor roxa-avermelhada, muito vigorosas e com um excelente sabor doce. Estas adquirem uma coloração mais intensa com a presença de frio. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 41833

**Alface var. Salad Bowl***Lactuca sativa*

A alface Salad Bow, do tipo “de cortar ou *cut-and-come-again*” ou folha de carvalho, possui um conjunto de folhas verdes, muito vigorosas e decorativas, com um excelente sabor doce.

Ciclo: 40-60 dias



Ref. 41850

**Alface var. Saladin***Lactuca sativa*

A alface iceberg Saladin forma uma cabeça de dimensão média-grande. As suas folhas são grossas e crocantes. Variedade de espigamento lento e pouco sensível ao míldio. Não é aconselhada para culturas de Outono. Ciclo: 50-70 dias.



Ref. 41800

**Alface var. Suzan***Lactuca sativa*

A Alface Suzan, de tipologia lisa, possui folhas grandes, macias e firmes que formam uma cabeça. As folhas são de cor verde e têm um sabor suave e adocicado. A planta atinge cerca de 30 cm de altura. É adequada para as culturas de Verão, não espigando com facilidade. Ciclo: 60-90 dias.



Ref. 41790

**Alface var. Victoria***Lactuca sativa*

A alface Victoria (sin. Twellose Gele, Excelsior, Blondine), de tipologia lisa, é uma variedade de ciclo precoce, com um crescimento rápido. Indicada para sementeiras iniciais. Bem adaptada a crescimentos de Inverno. Possui folhas grandes, de cor verde clara, que formam uma cabeça.



Ref. 41820

**Alface var. Maravilha das 4 Estações***Lactuca sativa*

A alface maravilha das 4 Estações é uma variedade muito confiável para a Primavera, Verão e Outono. As folhas são tenras e muito atractivas, com o rebordo de cor roxa. Ciclo: 2-3 meses.



Ref. 41810

**Alface var. "Black German"***Lactuca sativa*

A alface "Black German" deve o seu nome à cor da semente. É precoce, com um ciclo de 6-8 semanas. Deverá ser semeada na Primavera.



Ref. 41690

**Alho Francês var. Lancelot***Allium ampeloprasum var. porrum*

O alho-francês Lancelot ou Verde Azulado de Outono é bastante resistente e não sofre com o Outono /Inverno. Resiste bem às geadas. Atinge cerca de 25 cm de fuste. O alho-porro ou alho-francês requer um solo fértil e profundamente solto. O transplante deverá ocorrer quando as plantas possuírem o diâmetro de um lápis. Para obter hastes longas, rectas e brancas, deverá amontoar-se um par de vezes. Prefere locais ensolarados. Duração do ciclo: 180-200 dias.



Ref. 41695

**Alho Francês var. Gigante de Outono 2***Allium ampeloprasum var. porrum*

Esta variedade de alho-francês é ideal para a cultura de Outono. É uma planta robusta e vigorosa, com um caule espesso. Atinge cerca de 25-30 cm de fuste. O alho-porro ou alho-francês requer um solo fértil e profundamente solto. O transplante deverá ocorrer quando as plantas possuírem o diâmetro de um lápis. Para obter hastes longas, rectas e brancas, deverá amontoar-se um par de vezes. Prefere locais ensolarados. Ciclo: 180-200 dias.





Ref. 42040

**Beldroega***Portulaca oleracea*

Espécie bastante rústica, que cresce espontaneamente em muitos dos solos portugueses, sendo por vezes considerada uma infestante. Produz folhas brilhantes e muito saborosas. Deverá ser semeada na Primavera



Ref. 42030

**Beldroega de Inverno***Claytonia perfoliata*

Esta espécie tem é bastante resistente a doenças e pragas. Resiste bem às geadas, perdendo apenas alguma coloração das folhas. Deverá ser semeada no final do Verão com temperaturas do solo não muito altas, pois atrasa a germinação.



Ref. 41460

**Brócolo var. Calabrese Natalino***Brassica oleracea*

Variedade tradicional. Prefere o calor e um solo nutritivo e húmido.

Época de sementeira recomendada\*: Fevereiro a Abril (viveiro)



Ref. 41870

**Canónigos var. D'Olanda a seme grosso***Valerianella locusta*

Esta variedade não é muito susceptível ao frio. As folhas são do tipo ligeiramente alongado.



Ref. 41880

**Canónigos var. Vit***Valerianella locusta*

Esta variedade não é muito susceptível ao frio. As folhas são de cor verde escura, curtas e dispõem-se em forma de roseta.



Ref. 41380

**Cardo***Cynara cardunculus*

O cardo é um vegetal plurianual, muito antigo, originário da área Mediterrânica. A planta atinge cerca de 80-150 cm de altura. As folhas do cardo deverão ser previamente cozidas antes do consumo. O branqueamento ou estiolamento dos pecíolos, se desejado, deve começar a ser feito um ou dois meses antes da colheita. Isto é feito amarrando as folhas da planta e embrulhando o feixe dos pecíolos das folhas com um papel ou plástico escuro e opaco. Alternativamente, pode-se amontoar terra na base do feixe. Ciclo: 120-150 dias.



Ref. 41360

**Chicória var. Zuckerhut***Cichorium intybus var. foliosum*

A variedade zuckerhut, também conhecida por Pão de Açúcar Melhorada, é um vegetal típico de Outono/Inverno que pode suportar alguns danos provocados pelo frio. A planta atinge cerca de 30-40cm de altura. As suas folhas oblongas podem ser consumidas cruas ou cozinhadas. Cresce em muitos tipos de solos e é pouco exigente em fertilização. Ciclo: 70-90 dias.



Ref. 41470

**Couve chinesa var. Granaat***Brassica pekinensis*

A couve chinesa Granaat produz folhas grandes, longas e verdes. A couve chinesa não é resistente a geadas e é sensível ao espigamento precoce. Este tipo de couve requer um solo nutritivo e húmido, pouco ácido. A sementeira deverá ocorrer de Julho até o início de Agosto. A sementeira antecipada aumenta o risco de espigamento precoce.



Ref. 41580

**Couve-de-bruxelas var. Groninger***Brassica oleracea var. Gemmifera*

É um vegetal para o Outono/Inverno. A couve-de-bruxelas deve crescer o mais lentamente possível para obter a mais alta qualidade. O solo deverá estar continuamente húmido.



Ref. 41440

**Couve-flor var. Alpha***Brassica oleracea var. botrytis*

A Couve-flor Alpha é muito saborosa. Esta variedade produz cabeças grandes, firmes e brancas. A variedade Alpha exige um solo fértil. O cultivo precoce minimiza o risco do ataque por lagartas e moscas da couve.



Ref. 41445

**Couve-flor var. Flora Blanca***Brassica oleracea var. botrytis*

A Couve-flor Flora Blanca é uma variedade holandesa antiga. É uma variedade que produz uma cabeça branca e atractiva. A variedade Flora Blanca é mais adequada para o cultivo do Outono, com transplantação no Verão.



Ref. 41450

**Couve Kale var. Westlandse Winter***Brassica oleracea var. acephala*

Variedade que produz folhas altas, de cor verde a verde-escura, bastante enrugadas.



Ref. 41455

**Couve Kale var. Roter Grünkohl***Brassica oleracea var. acephala*

Varietade que produz folhas altas, de cor roxa, muito atrativas e bastante enrugadas.



Ref. 41505

**Couve Kale var. Negra da Toscana***Brassica oleracea var. acephala*

Esta variedade produz folhas suculentas, saborosas e verdes escuras. Boa tolerância ao frio.



Ref. 41570

**Couve Pakchoi TAISAI***Brassica rapa var. chinensis*

A Couve Pakchoi Taisai é uma brássica de rápido crescimento, oriunda da Ásia Oriental, com folhas verde-acizentadas, dispostas em forma de roseta. Os pecíolos e nervuras de cor branca são características que definem esta brássica. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 411490

**Couve Rábano var. Delicatess White***Brassica oleracea var. gongylodes*

Esta couve-rábano forma cabeças verdes de polpa branca. É uma cultura de rápido crescimento, com um sabor muito agradável, podendo ser consumido cru ou cozinhado. Pode ser semeado cedo, pois resiste bem ao espigamento. Requer boa adubação.



Ref. 411500

**Couve Rábano var. Superschmelz***Brassica oleracea var. gongylodes*

Esta variedade de couve-rábano deve ser plantada após a variedade Delicatess White e Blue. As cabeças podem atingir os 2 kg sem se tornarem demasiado lenhosas. A couve rábano é pouco sensível ao espigamento, podendo ser plantada cedo. Requer boa fertilização.



Ref. 411480

**Couve Rábano var. Delicacy Purple***Brassica oleracea var. gongylodes*

Esta couve-rábano forma bonitas cabeças de cor azul arroxeadas, com uma polpa branca. É uma cultura de rápido crescimento, com um sabor muito agradável, podendo ser consumido cru ou cozinhado. Pode ser semeado cedo, pois resiste bem ao espigamento. Requer boa adubação.





Ref. 41530

**Couve Repolho var. Bloemendaalse Gele***Brassica oleracea var. capitata*

O repolho Savoy Bloemendaalse Gele possui uma forma semi-arredondada, de cor verde clara, com um sabor excelente. Pode suportar algumas geadas e requer um solo húmido e fertilizado.



Ref. 41520

**Couve Repolho var. Westlandse Putjes***Brassica oleracea var. capitata*

O repolho Westlandse Putjes possui uma cor verde escura, com folhas bastante frisadas em que as folhas superiores não estão completamente fechadas, mas interiormente forma um coração redondo. Possui alguma tolerância às geadas. Este tipo de repolho requer um solo fertilizado e húmido.



Ref. 41560

**Couve Repolho var. Gigante das Hortas***Brassica oleracea var. capitata*

O repolho gigante das hortas é um repolho de cabeça de forma redonda e muito apropriado para armazenamento. Deve ser cultivado em um solo fértil e húmido.



Ref. 41540

**Couve Repolho var. Roem Van Enkhuizen 2***Brassica oleracea var. capitata*

O repolho branco Roem Van Enkhuizen é um repolho relativamente rápido e pesado, utilizado sobretudo para fazer chucrute. Esta variedade é bastante sensível ao rachamento. Deve ser cultivado num solo fértil e húmido.



Ref. 411510

**Couve Repolho Roxa var. Rojo tardio de Langedijk 2***Brassica oleracea var. capitata*

Esta variedade forma um lindo repolho roxo com uma cabeça de forma redonda. Esta variedade requer um solo nutritivo e húmido.



Ref. 41550

**Couve Coração var. Filderkraut***Brassica oleracea var. capitata*

Este é um repolho que se distingue pelo seu excelente sabor. Esta variedade tem um sabor suave e pode ser usada para chucrute. A couve-coração Filderkraut é relativamente fácil de produzir. Deve ser cultivada em solo fertilizado e húmido, embora exija menos do solo do que outras couves repolho.

Época de sementeira recomendada\*: Março-Abril (viveiro)





Ref. 41572

**Couve TATSOI***Brassica rapa var. rosularis*

A Couve Tatsoi constitui uma alternativa à Couve Pak Choi. As folhas redondas e grossas são muito crocantes e podem ser consumidas cruas ou cozinhadas. É uma planta fácil de produzir, com germinação e crescimento rápido. Pode ser feita por sementeira directa ou transplantação que ocorre quando as primeiras folhas surgirem. O solo deverá estar sempre húmido, mas sem que fique encharcado. A planta atinge uma altura de 10-20 cm. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 41020

**Endívia (Frisada) var. Wallonne***Chicorium endívia*

A endívia Wallonne (sin. President) é uma variedade com folhas finas, precisas e frisadas. Ciclo: 90 dias.



Ref. 41010

**Endívia var. Number Five 2***Chicorium endívia*

A Endívia Number Five 2 é das variedades de endívias mais utilizadas. Esta variedade forma um “coração” bem preenchido. As folhas são largas e têm um sabor suave.

Ciclo: 90 dias.



Ref. 42000

**Erva Armola Rosa ou Espinafre Francês***Atriplex hortensis*

A Erva Armola (Red Orache), também chamada de Espinafre Francês ou Espinafre da Montanha tem folhas roxas e erectas. Contudo, pode ser preparada da mesma forma que os espinafres, podendo ser cozinhada ou consumida crua, em saladas. Se a planta crescer demasiado apenas se aconselha o consumo das folhas, pois o pecíolo torna-se demasiado fibroso. A planta pode atingir a altura de cerca de 100 cm.

Ciclo: 30-60 dias.



Ref. 41990

**Erva Armola Verde ou Espinafre Francês***Atriplex hortensis*

A Erva Armola Verde (Garden Orache) cresce bem em diversos tipos de solos. Pode ser preparada da mesma forma que os espinafres, podendo ser cozinhada ou consumida crua, em saladas. Se a planta crescer demasiado apenas se aconselha o consumo das folhas, pois o pecíolo torna-se demasiado fibroso. A planta pode atingir a altura de cerca de 100 cm. Ciclo: 30-60 dias.



Ref. 41935

### Espinafre var. Gigante de Inverno

*Spinacia oleracea*

O espinafre Gigante de Inverno é uma variedade que se adapta ao cultivo de Inverno e princípio da Primavera. Produz folhas bastante largas, de cor verde-escuro e é extremamente resistente ao frio. Esta variedade, no Verão, tende a espigar. Ciclo: 40-70 dias.



Ref. 41920

### Espinafre var. Gigante Precoce

*Spinacia oleracea*

O espinafre Gigante Precoce é uma variedade com um crescimento rápido, ideal para culturas precoces. Não é muito sensível à geada. Ciclo: 30-60 dias.



Ref. 41610

### Espinafre Tetragónia ou Espinafre da Nova Zelândia

*Tetragonia tetragonioides*

O espinafre da Nova Zelândia ou Tetragónia pertence à família *Portulacaceae* e tem um aspecto muito diferente do espinafre comum. Estas plantas possuem muito vigor, crescendo de forma rasteira. As folhas e os caules podem ser colhidos regularmente e a preparação culinária é semelhante ao espinafre regular. As sementes germinam lentamente e preferem as altas temperaturas. Ciclo: 60-80 dias.



Ref. 41827

### Mix Alfoces

O Mix de Alfoces é uma mistura colorida de alfoces babyleafs: “Red salad Bowl”, “Suzan”, “Wonder of the Four Year Tides” e “Little Leprechaun”. Possuem um sabor suave. As plantas poderão ser colhidas quando atingirem cerca de 10 cm de altura. Permitem cerca de 3 cortes.



Ref. 41825

### Mix Asiático

O Mix Asiático é uma deliciosa mistura de pakchoi, mizuna e mostarda, de sabor picante. A colheita poderá ser feita aproximadamente 3-4 semanas, quando as plantas possuem cerca de 10 cm de altura. As plantas permitem cerca de 3 cortes.



Ref. 41725

### Mizuna

*Brassica rapa subsp. campestris*

A Mizuna é uma hortaliça cultivada extensivamente no Japão. As suas folhas mais jovens podem ser consumidas cruas em saladas e as outras folhas normalmente são consumidas cozidas ou refogadas. O seu sabor é moderadamente picante. A planta normalmente rebrota após a colheita das folhas, permitindo que sejam feitas várias colheitas. Apresenta alguma tolerância à geada. É uma cultura típica de Primavera. As plantas espigam muito cedo durante o Verão. As folhas podem ficar amarelas quando a fertilização é insuficiente. Ciclo: 30-50 dias.



Ref. 41032

**Mostarda var. Golden Frills***Brassica juncea*

A Mostarda Golden Frills apresenta folhas finas, verdes, frescas e com um sabor picante. A planta atinge cerca de 30-40cm. Boa resistência ao frio. Ciclo: 45-60 dias.



Ref. 41035

**Mostarda var. Purple Frills***Brassica juncea*

A Mostarda Purple Frills apresenta folhas finas, arroxeadas, frescas e com um sabor picante. A planta atinge cerca de 30-40cm. Boa resistência ao frio. Ciclo: 45-60 dias.



Ref. 41575

**Mostarda var. Red Giant***Brassica juncea*

Também chamada de Mostarda Asiática, é uma planta com 20-30 cm de altura que produz folhas redondas, de cor roxa ligeiramente com matizes verdes, muito tenras e picantes. Pode suportar bem as geadas e permite uma rápida produção e por longos períodos. Prefere locais ensolarados. Ciclo: 40-60 dias.



Ref. 41720

**Nabiça var. Namenia***Brassica rapa*

Esta nabiça produz folhas saborosas, grandes e macias, tendo um curto período de crescimento. É um vegetal típico de Primavera. As plantas espigam muito cedo durante o Verão. As folhas podem ficar amarelas se houver uma fertilização insuficiente. Ciclo: 30-50 dias



Ref. 41760

**Rúcula Cultivada var. Esmée***Eruca sativa*

A rúcula cultivada Esmée é uma variedade criada pela De Bolster. A rúcula Esmée possui umas bonitas folhas dentadas. Tem um sabor a noz picante, mas não amargo. As jovens folhas podem ser cortadas rente ao solo ou arrancadas pela raiz. O coração da planta deverá permanecer intacto se se pretender várias colheitas. A planta atinge cerca de 15 cm de altura. O risco de danos causados pela geada é baixo. Ciclo: 20-40 dias.



Ref. 41765

**Rúcula Selvagem***Diplotaxis tenuifolia*

A rúcula selvagem demora mais tempo a germinar do que a rúcula cultivada, sendo desejável uma temperatura do solo de cerca de 20°C. É importante fazer uma boa preparação da cama da semente (solo de estrutura homogénea, com poucos e pequenos torrões). As folhas podem ser colhidas durante um longo período. O coração da planta deve permanecer intacto se se pretender várias colheitas.



### Contactos

AdviceAgriBusiness Unip., Lda.

Rua Alexandre Herculano, nº 38, 1º esq. 2860-180 Alhos Vedros - Portugal

Tel.: (00351) 913 894 820 (Eng. Sérgio Margaço)

[comercial@365agro.com](mailto:comercial@365agro.com)

[www.adv-agri.com](http://www.adv-agri.com)

### Aviso Legal

A Advice.AgriBusiness visa garantir que as informações dadas estão actualizadas e são precisas. A Advice.AgriBusiness não pode ser responsabilizada por danos directos ou indirectos decorrentes do uso dessas informações. Para mais informações, contacte-nos.

Ed. 01-03-2018